

kalten Bergwassern, die zum Neckar eilen, letzterer selbst immer mehr eingeengt, somit für die Entwicklung einer die stillen sumpfigen Gewässer liebenden Fauna höchst ungünstig.

Anders gestalten sich die Verhältnisse auf der Neckarebene, dem dritten Abschnitte. Hier entwickeln die Wassermollusken, besonders *Limnaea* und *Planorbis*, einen gewaltigen Artenreichtum und drücken eigentlich diesem Gebiete den Charakter auf.

Eberbach a. N., im April 1873.

Beiträge zur Kenntniss der Mollusken im Amte Bordesholm, Kreis Kiel.

Von Dr. Kaestner in Bordesholm.

- Arion empiricorum* Fér. findet man im Wildhof, kleines Gehölz bei Bordesholm.
 — *subfuscus* Fér. Dasselbst.
 — *hortensis* Fér. Fast in jedem Garten und in Hecken.
- Amalia marginata* Draparnaud. An der Ostseite der Kirchhofsmauer im Orte Bordesholm.
- Limax arborum* Bouchard. Im Buchengehege bei Voorde vorzugsweise.
 — *agrestis* Linné. Ueberall in Kohl- und Gemüsegärten in Massen.
 — *unicolor* Heynemann. Im Landrathsgarten zu Bordesholm und am Ufer des Sees daselbst.
 — *brunneus* Drap. Dasselbst.
- Vitrina elongata* Drap.. Zu Bordesholm im Landrathsgarten und in Voorde.
 — *pellucida* Müller. Dasselbst.
 — *major* Fér. In schönen Exemplaren bei Voorde und zu Heeschenberg, Guts Schierensee.
- Helix nitidula* Drap. Bei Voorde und im untern Rande des Gehölzes, wo der Ellerbruch beginnt.
 — *nitens* Michaud. Dasselbst.
 — *nitidosa* Fér. Dasselbst.
 — *nitida* Müll. Dasselbst.
 — *crystallina* Müll. Dasselbst.
 — *subterranea* Bourguignat. Dasselbst.
 — *hyalina* Fér. Dasselbst.
 — *fulva* Müll. Im Amtsgarten in Bordesholm.
 — *cellaria* Müll. Dasselbst.
 — *pomatia* Linn.
 — *hortensis* Müll. } Im Landrathsgarten zu Bordesholm und auf dem
 — *nemoralis* Linn. } Kirchhofe daselbst; sehr häufig.
 — *arbustorum* Linn. }
 — *costulata* Ziegler }
 — *ericetorum* Müll. } Dasselbst.
 — *sericea* Drap. }
 — *depilata* C. Pfeiffer }
 — *hispida* Müll. }
 — *strigella* Drap. } Beim Wirthshause zu Heeschenberg in schönen Exem-
 — *incarnata* Müll. } plaren.
 — *alliaria* Müll. } Im Landrathsgarten zu Bordesholm an der östlichen
 — *pygmaea* Drap. } Seite der Kirchhofsmauer. Die erstere wurde auch im
 — *rotundata* Müll. } Sommer 1871 vom Lehrer Fach in Kiel und von mir
 — *costata* Müll. } im Holze zu Heeschenberg gefunden.

- Helix aculeata* Müll. im Gehölze Wildhof bei Bordesholm und im Gehölze Jettbrock bei Hoffelde.
- *lamellata* Jeffreys. Im Amte Kiel zuerst wieder von Lehrer Fach gefunden, demnächst von mir im Gross-Buchwalder Holze östlich zu vielen Exemplaren angetroffen; auch im Jettbrocker Gehege und Blumenthaler Bandenholz.
- *fruticum* Müll. in der Eiderwiese, wo der Fussweg über die Eider nach dem Kirchorte Gross-Flineck führt, in schönen gebänderten Exemplaren.
- Buliminus obscurus* Müll. Fast in jedem Buchengehölz reichlich.
- *tridens* Müll. } Im Holze zu Heeschenberg und im Holze bei Ramohr
— *montanus* Drap. } vereinzelt von mir angetroffen.
- Cionella lubrica* Müll. Im Amtsgarten in Bordesholm und zu Heeschenberg reichlich.
- Pupa muscorum* Linn. }
— *minutissima* Hartmann } Im Amtsgarten zu Bordesholm.
- *ventrosa* Heynem. Am Mühlenteiche bei Voorde.
- *Shuttleworthiana* von Charpentier. } An der östlichen Seite der Kirch-
— *pusilla* Müll. } hofsmauer zu Bordesholm.
- Balea fragilis* Drap. Dasselbst. Meines Wissens hier in den Herzogthümern noch nicht weiter aufgefunden.
- Clausilia laminata* Montagu. } Beim Wirthshause zu Heeschenberg und an der
— *plicatula* Drap. } östlichen Seite der alten Kirchhofsmauer in Bor-
— *nigricans* Pulteney } deshalm; reichlich.
- *dubia* Drap. }
— *biplicata* Mont. } An der östlichen Seite der alten Kirchhofsmauer in
— *parvula* Studer. } Bordesholm ebenfalls in reichlicher Fülle.
- Succinea patris* Linné. } Auf dem Kirchhofe in Bordesholm und an dem
— *Pfeifferi* Rossmässler. } nahen Seeufer des Landrathsgartens daselbst;
— *oblonga* Drap. } erstere beide in schönen Exemplaren.
- *arenaria* Bouch. An der östlichen Seite der alten Kirchhofsmauer und auf der Oelteichswiese zu Bordesholm in vielen Exemplaren. Meines Wissens hier in den Herzogthümern noch nicht weiter aufgefunden.
- Carychium minimum* Müll. Fast in jedem Buchenholz.
- Limnaea stagnalis* Müll. } Im Einfelder und Bordesholmer See in schönen
— *auricularia* Drap. } Exemplaren.
- *ovata* Drap. }
— *peregra* Drap. Am Wasserlauf im Kirchorte Gross-Flintbeck.
- *minuta* Drap. In den Wiesengraben bei Klein-Harrie (in der Nähe des Dosenmoors).
- *elongata* Drap. Im Landrathsgarten zu Bordesholm.
- *palustris* Drap. In der Eider und im Mühlenteiche bei Voorde und Schmalstede.
- Physa fontinalis* Linn. } Im Verbindungsgraben zwischen Mühbrock u. Bordes-
— *hypnorum* Linn. } holm in schöner Auswahl; letztere auch in der Pastorats-
wiese am Ausflusse des Waldbaches zu Bordesbolm.
- Planorbis corneus* Linné. In der Eider und in den Wiesengraben daselbst.
- *marginatus* Drap. } Im Bordesholmer See.
— *carinatus* Müll. }
— *contortus* Müll. In einer Tränkstelle in der Nähe des Torfmoors beim Dorfe Söven.
- *vortex* Müll. } Im oberen Mühlenbach bei der Voorder Mühle in schönen
— *cristatus* Drap. } Exemplaren.
- *spirorbis* Müll. }
— *complanatus* Drap. } In der Tränkstelle der Oberfürster-Koppel auf Hof-
— *nitidus* Müll. } felfelde von mir gefunden.

- Ancylus lacustris* Linn. Im Schilf und an glatten Pfählen im Bordesholmer See.
 — *fluviatilis* Linn. An der Eiderbrücke bei Hammer und beim Dorfe Gross-Buchwald.
- Acicula fusca* Walker. Im Blumenthaler Bandenholz an der Chaussée.
- Cyclostoma elegans* Drap. Bei Schönhagen im Gute Bothkamp im Buchenbestande auf einer Erhöhung im Karpenteiche 1871 von mir gefunden.
- Paludina vivipara* Müll. Im Mühlenbach bei Voorde.
- Bythinia tentaculata* Linn. Im Bordesholmer See am nordwestlichen Ufer des Landrathgartens.
 — *Leachii* Sheppard. Dasselbst und im Mühlenbach bei Voorde.
- Hydrobia stagnalis*. Am unteren Theile des Pastoratgartens zu Gross-Flintbeck neben den Wiesenquellen.
- Valvata piscinalis* Müll. } In der Niederung am nordöstlichen und nordwestlichen
 — *cristata* Müll. } Ufer des Mühlenbachs bei Voorde, zumal bei niederem
 — *spirorbis* Drap. } Oberwasser der Eider.
 — *minuta* Drap. }
- Unio batavus* Lamarck. } Im Mühlenteich bei Voorde.
 — *pictorum* Linn. }
 — *tumidus* Retzius. In der Unter-Eider bei der Voorder-Mühle und beim Schulensee.
 — *margaritifer* Retz. Im Schulensee.
- Anodonta cygnea* Linn. } Dasselbst; letztere auch im Mühlenteich bei Schmal-
 — *piscinalis* Nilsson. } stede.
 — *ponderosa* C. Pf. Im Einfelder See und Schulensee.
 — *complanata* Ziegl. Im Einfelder See.
 — *cellensis* Schrötter. Im Bordesholmer See, beim Oberförstergarten in schönen Exemplaren.
- Cyclas rivicola* Lam. } In der Tränkstelle der früheren Amtschreiberkoppel auf
 — *cornea* Linn. } dem Hoffelde.
 — *lacustris* Drap. }
 — *calyculata* Drap. In den Wiesengräben bei der Schmalstedter Mühle.
- Pisidium pusillum* Jenyns. In den Wiesengräben des Pastoratgartens zu Gross-Flintbeck.
 — *fontinale* C. Pf. } Im Verbindungsgraben des Einfelder und Bordes-
 — *obtusale* C. Pf. } holmer Sees.

Zum Schlusse möchte ich nochmals hervorheben, dass der Landrathgarten zu Bordesholm, früher Klostergarten der Augustiner-Mönche, eine reiche Fundstelle von Land- und Süßwasser-Mollusken ist, ingleichen, dass die Landseen und Tränkstellen, sowie die Eider und Zuflussgräben im Amte Bordesholm reich an Süßwasser-Mollusken sind.

Scheveningen, Holland.

In der zweiten Woche vom März d. J. führte mich ein Geschäft zum Haag. Ich benutzte diese Gelegenheit, dem nahen Seebad Scheveningen ein paar Tage zu widmen, um die frische Seeluft zu geniessen. Das Wetter war günstig, aber ein scharfer kalter Wind blies den Strand entlang und sandte ein Meer feinen Sandes von den Dünen schräg dem Ufer zu, was das Auffinden von Muscheln sehr erschwerte; dennoch gelang es mir, etwa 27